

# ALJABAR LINEAR

## Pertemuan 11

Egi Safitri

# **Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt**

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

- Untuk menyelesaikan sejumlah kasus yang melibatkan ruang vektor, kita bebas memilih basis untuk ruang vektor tersebut yang dianggap sesuai.
- Di ruang hasil kali dalam, suatu basis yang vektor-vektornya saling orthogonal satu sama lain kerap kali dijadikan sebagai pilihan terbaik.
- Lebih lanjut akan dibahas bagaimana basis-basis tersebut diperoleh.

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Definition

- Himpunan vektor-vektor dalam ruang hasilkali dalam disebut sebagai **Himpunan Ortogonal**, jika setiap pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut saling ortogonal.
- Himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki norma 1 disebut **Ortonormal**.
- Dengan kata lain,  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  dari vektor-vektor di  $\mathbf{V}$  adalah ortonormal apabila

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_k \rangle &= 0, j \neq k \\ \langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_k \rangle &= 1, j = k \\ j, k &= 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Example

Suatu himpunan  $\mathbf{V} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  dapat dikatakan ortonormal apabila berlaku

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle &= 0, \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = 0, \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = 0 \\ \|\mathbf{v}_1\| &= \|\mathbf{v}_2\| = \|\mathbf{v}_3\| = 1\end{aligned}$$

### Example

Diberikan himpunan  $\mathbf{V} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  dengan

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \mathbf{v}_3 = \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

adalah vektor-vektor di  $R^3$  yang dilengkapi hasilkali dalam euclid.  
Tunjukkan bahwa himpunan  $\mathbf{V}$  ortonormal.

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Solution

- Himpunan  $\mathbf{V}$  dikatakan ortonormal apabila memenuhi

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = 0, \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = 0, \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = 0 \text{ dan } \|\mathbf{v}_1\| = \|\mathbf{v}_2\| = \|\mathbf{v}_3\| = 1$$

- Perhatikan bahwa

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = 0 \cdot -\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot -\frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Solution

- *Selanjutnya diperoleh*

$$\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

$$\|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$$

$$\|\mathbf{v}_3\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$$

- *Dengan demikian  $\mathbf{V}$  ortonormal.*

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

- Setiap himpunan ortogonal yang memuat vektor tak nol dapat dikonversi menjadi himpunan ortonormal dengan cara menormalisasikan setiap vektornya.
- Proses **normalisasi suatu vektor tak nol  $\mathbf{v}$**  dilakukan dengan cara mengalikan vektor tersebut dengan resiprok (kebalikan) normanya, untuk menghasilkan vektor baru dengan norma 1.

### Definition

Proses perkalian suatu vektor tak nol  $\mathbf{v}$  dengan kebalikan panjangnya (*norm*) untuk memperoleh suatu vektor dengan norm 1 disebut dengan **penormalan** atau **normalisasi (normalizing)  $\mathbf{v}$** , yakni

$$\left\| \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v} \right\| = \left| \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \right| \|\mathbf{v}\| = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \|\mathbf{v}\| = 1$$

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Example

Misalkan

$$\mathbf{u}_1 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{u}_2 = (1, 0, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 0, -1)$$

Proses normalisasi  $\mathbf{u}_1$ ,  $\mathbf{u}_2$ , dan  $\mathbf{u}_3$  menghasilkan

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|} \mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2}} (0, 1, 0) = (0, 1, 0)$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_2\|} \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} (1, 0, 1) = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_3\|} \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} (1, 0, -1) = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Example

Tunjukkan bahwa himpunan  $\mathbf{S} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  yang diperoleh pada contoh sebelumnya merupakan himpunan ortonormal.

Teorema berikut ini memperlihatkan bahwa sederhana sekali untuk menyatakan suatu vektor dalam suku-suku dari suatu basis ortonormal.

## Theorem

*Jika  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  adalah suatu basis ortonormal untuk suatu ruang hasilkali dalam  $V$ , dan  $\mathbf{u}$  adalah sebarang vektor di  $V$ , maka*

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n$$

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Example

Diberikan vektor-vektor

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right), \quad \mathbf{v}_3 = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$$

Mudah diperiksa bahwa himpunan  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  adalah basis ortonormal untuk  $R^3$  dengan hasil kali dalam Euclid. Nyatakan vektor  $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$  sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di  $S$  dan tentukan vektor koordinat  $(\mathbf{u})_S$ .

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Solution

Perhatikan bahwa

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle = 1 \cdot -\frac{4}{5} + 1 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{3}{5} = -\frac{1}{5}$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_3 \rangle = 1 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

### Solution

sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{v}_3 \\ &= 1 \cdot \mathbf{v}_1 - \frac{1}{5} \mathbf{v}_2 + \frac{7}{5} \mathbf{v}_3 \end{aligned}$$

$$(1, 1, 1) = (0, 1, 0) - \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \\ - \\ 0, \frac{3}{5} \end{pmatrix} + \frac{7}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ - \\ 0, \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Solution

Adapun vektor koordinat  $\mathbf{u}$  yang relatif terhadap  $S$  adalah

$$\begin{aligned}(\mathbf{u})_S &= (\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_3 \rangle) \\ &= \left( 1, -\frac{1}{5}, \frac{7}{5} \right)\end{aligned}$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Theorem

*Jika  $S$  adalah sebuah basis ortonormal untuk sebuah ruang hasilkali dalam berdimensi  $n$ , dan jika*

$$(\mathbf{u})_S = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad (\mathbf{v})_S = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

*Maka*

- 1  $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$
- 2  $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$
- 3  $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Example

Jika  $R^3$  memiliki hasil kali dalam euclid, maka norma dari vektor  $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$  adalah

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

Dari contoh sebelumnya jika  $R^3$  memiliki basis ortonormal  $S$ , dapat diketahui vektor koordinat  $\mathbf{u}$  yang relatif terhadap  $S$  adalah

$$(\mathbf{u})_S = \left(1, -\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$$

Norma  $\mathbf{u}$  juga dapat dihitung dari vektor ini,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{3}$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Theorem

Diberikan himpunan ortonormal  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  di suatu ruang hasilkali dalam  $V$ . Jika  $W$  adalah ruang yang direntang oleh  $v_1, v_2, \dots, v_n$  maka setiap vektor  $\mathbf{u} \in V$  bisa dinyatakan dalam bentuk

$$\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

dengan  $\mathbf{w}_1 \in W$  dan  $\mathbf{w}_2$  ortogonal terhadap  $W$ .

- $\mathbf{w}_1$  disebut **proyeksi ortogonal  $\mathbf{u}$  pada  $W$** , dinotasikan,  $\text{proj}_W \mathbf{u}$ .
- $\mathbf{w}_2$  disebut **komponen  $\mathbf{u}$  yang ortogonal terhadap  $W$** , dinotasikan,  $\text{proj}_{W^\perp} \mathbf{u}$ .
- Hal ini berarti

$$\mathbf{u} = \text{proj}_W \mathbf{u} + \text{proj}_{W^\perp} \mathbf{u}$$

dan karena  $\mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{w}_1$ , maka

$$\text{proj}_{W^\perp} \mathbf{u} = \mathbf{u} - \text{proj}_W \mathbf{u}$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Theorem

Misalkan  $W$  adalah suatu subruang berdimensi berhingga dari suatu ruang hasilkali dalam  $V$ .

- ① Jika  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$  adalah sebuah basis ortonormal untuk  $W$  dan  $\mathbf{u}$  adalah sebarang vektor pada  $V$ , maka

$$\text{proj}_W \mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_r \rangle \mathbf{v}_r$$

- ② Jika  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$  adalah sebuah basis ortogonal untuk  $W$  dan  $\mathbf{u}$  adalah sebarang vektor pada  $V$ , maka

$$\text{proj}_W \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 + \cdots + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_r \rangle}{\|\mathbf{v}_r\|^2} \mathbf{v}_r$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Example

Diberikan ruang vektor  $R^3$  dengan hasil kali dalam Euclid dan subruang vektor  $W$  yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0)$$

$$\mathbf{v}_2 = \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right)$$

Tentukan Proyeksi ortogonal  $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$  pada  $W$  dan komponen  $\mathbf{u}$  yang ortogonal terhadap  $W$ .

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Solution

Proyeksi ortogonal  $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$  pada  $W$  :

$$\begin{aligned} \text{proj}_W \mathbf{u} &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 \\ &= (1) (0, 1, 0) + \left(-\frac{1}{5}\right) \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right) \\ &= \left(\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}\right) \end{aligned}$$

Komponen  $\mathbf{u}$  yang ortogonal terhadap  $W$

$$\begin{aligned} \text{proj}_{W^\perp} \mathbf{u} &= \mathbf{u} - \text{proj}_W \mathbf{u} \\ &= (1, 1, 1) - \left(\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}\right) \\ &= \left(\frac{21}{25}, 0, \frac{28}{25}\right) \end{aligned}$$

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

## Theorem

*Setiap ruang hasilkali dalam tak nol yang berdimensi berhingga mempunyai suatu basis ortonormal*

## Proof.

Misal  $V$  ruang hasilkali dalam tak nol yang berdimensi  $n$ , dan suatu himpunan  $U = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$  sembarang basis untuk  $V$ . Basis ortogonal  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  untuk  $V$ , dapat diperoleh melalui **Proses Ortogonalisasi Gram-Schmidt**, dengan langkah-langkah sebagai berikut: □

# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

Proof.

1. Misal  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$
2. Membentuk vektor  $\mathbf{v}_2$  yang ortogonal terhadap  $\mathbf{v}_1$  dengan cara menghitung komponen dari  $\mathbf{u}_2$  yang ortogonal terhadap ruang  $W_1$  yang direntang oleh  $\mathbf{v}_1$ , yaitu

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_2 &= \mathbf{u}_2 - \text{proj}_{W_1} \mathbf{u}_2 \\ &= \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1\end{aligned}$$



# Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

Proof.

3. Membentuk vektor  $\mathbf{v}_3$  yang ortogonal terhadap  $\mathbf{v}_1$  dan  $\mathbf{v}_2$  dengan cara menghitung komponen dari  $\mathbf{u}_3$  yang ortogonal terhadap ruang  $W_2$  yang direntang oleh  $\mathbf{v}_1$  dan  $\mathbf{v}_2$ , yaitu

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_3 &= \mathbf{u}_3 - \text{proj}_{W_2} \mathbf{u}_3 \\ &= \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2\end{aligned}$$

4. Proses dilanjutkan sampai  $\mathbf{v}_n$ , untuk menghasilkan himpunan ortogonal  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  yang terdiri dari  $n$  vektor bebas linear di  $V$  dan merupakan suatu basis ortogonal untuk  $V$ . Penormalan vektor-vektor di basis ortogonal akan menghasilkan basis ortonormal.



## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

Secara umum, **Proses Gram-Schmidt** dapat dinyatakan dengan

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2} \mathbf{v}_j, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

### Example

Diberikan  $V = R^3$  dengan hasil kali dalam Euclid. Terapkan algoritma **Gram-Schmidt** untuk mengortogonalkan basis

$$\{(1, -1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 2)\}$$

Normalisasikan vektor-vektor basis ortogonal yang diperoleh menjadi sebuah basis ortonormal.

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Solution

Misal  $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (1, 0, 1)$ ,  $\mathbf{u}_3 = (1, 1, 2)$

- Langkah 1

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 = (1, -1, 1)$$

- Langkah 2

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_2 &= \mathbf{u}_2 - \text{proj}_{W_1} \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 \\ &= (1, 0, 1) - \frac{1 \cdot 1 + 0 \cdot -1 + 1 \cdot 1}{3} (1, -1, 1) \\ &= (1, 0, 1) - \left( \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) \\ &= \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)\end{aligned}$$

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Solution

- *Langkah 3*

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_3 &= \mathbf{u}_3 - \text{proj}_{W_2} \mathbf{u}_3 \\ &= \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 \\ &= (1, 1, 2) - \frac{2}{3} (1, -1, 1) - \frac{5}{2} \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) \\ &= \left( -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

- *Dengan demikian, diperoleh basis ortogonal*

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \left\{ (1, -1, 1), \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right), \left( -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

## Basis Ortonormal dan Proses Gram-Schmidt

### Solution

- Selanjutnya dapat diperoleh basis ortonormal  $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$  dengan

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{(1, -1, 1)}{\sqrt{3}} = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \left( \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|} = \frac{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = \left( \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) = \left( \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6} \right)$$

$$\mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{v}_3}{\|\mathbf{v}_3\|} = \frac{\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \left( -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

# Aproksimasi Kuadrat Terkecil

# Aproksimasi Kuadrat Terkecil

## Problem

*Jika diberikan sebuah sistem linear  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  yang terdiri dari  $m$  persamaan dengan  $n$  variabel, tentukan sebuah vektor  $\mathbf{x}$  jika memungkinkan, yang dapat meminimalkan nilai  $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$  merujuk pada hasil kali dalam Euclidean pada  $R^m$ . Vektor semacam ini disebut sebagai **Solusi Kuadrat Terkecil** dari  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ .*

## Aproksimasi Kuadrat Terkecil

Berikut diberikan beberapa Teorema yang berkaitan dengan Solusi Kuadrat Terkecil.

### Theorem

*Untuk sebarang sistem linear  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , sistem normal yang terkait*

$$A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

*bersifat konsisten dan semua solusi dari sistem normal adalah solusi kuadrat terkecil dari  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . Selanjutnya, jika  $W$  adalah ruang kolom dari  $A$ , dan  $\mathbf{x}$  adalah solusi kuadrat terkecil sebarang dari  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , maka proyeksi ortogonal  $\mathbf{b}$  pada  $W$  adalah*

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = A\mathbf{x}$$

# Aproksimasi Kuadrat Terkecil

## Theorem

*Jika  $A$  matiks  $m \times n$ , maka pernyataan berikut ekuivalen*

- 1  *$A$  memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linear.*
- 2  *$A^T A$  dapat dibalik*

## Aproksimasi Kuadrat Terkecil

### Theorem

*Jika  $A$  matriks  $m \times n$  yang memiliki vektor-vektor kolom bebas linear, maka untuk setiap matriks  $\mathbf{b}$ ,  $m \times 1$ , sistem linear  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  memiliki solusi kuadrat terkecil yang unik, yakni*

$$\mathbf{x} = \left(A^T A\right)^{-1} A^T \mathbf{b} \quad (10)$$

*Selanjutnya, jika  $W$  adalah ruang kolom dari  $A$ , maka proyeksi ortogonal  $\mathbf{b}$  pada  $W$  adalah*

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = A\mathbf{x} = A \left(A^T A\right)^{-1} A^T \mathbf{b} \quad (11)$$

## Aproksimasi Kuadrat Terkecil

### Example

Tentukan solusi kuadrat terkecil dari sistem linear  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  yang diberikan oleh

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 4 \\3x_1 + 2x_2 &= 1 \\-2x_1 + 4x_2 &= 3\end{aligned}$$

dan tentukan proyeksi ortogonal  $\mathbf{b}$  pada ruang kolom  $A$ .

### Solution

*Diketahui*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

## Aproksimasi Kuadrat Terkecil

### Solution

Selanjutnya dapat kita peroleh

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 21 \end{bmatrix}$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix}$$

sehingga sistem normal  $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$  dalam kasus ini adalah

$$\begin{bmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 21 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix}$$

# Aproksimasi Kuadrat Terkecil

## Solution

*Dengan menyelesaikan sistem diatas diperoleh*

$$x_1 = \frac{17}{95} \text{ dan } x_2 = \frac{143}{285}$$

*Berdasarkan persamaan (11) diperoleh proyeksi ortogonal  $\mathbf{b}$  pada ruang kolom  $A$ , yaitu*

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{17}{95} \\ \frac{143}{285} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{92}{285} \\ \frac{439}{285} \\ \frac{94}{57} \end{bmatrix}$$

# Latihan

1. Misal  $\mathbf{p} = a_0 + a_1x + a_2x^2$  dan  $\mathbf{q} = b_0 + b_1x + b_2x^2$  sembarang vektor di  $P_2$ . Tunjukkan apakah himpunan polinomial berikut ini memenuhi sifat ortonormal atau tidak dengan mengacu pada definisi hasilkali dalam

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$$

- a.  $\left\{ \left( \frac{2}{3} - \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^2 \right), \left( \frac{2}{3} + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}x^2 \right), \left( \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}x^2 \right) \right\}$
- b.  $\left\{ (1), \left( \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}x^2 \right), (x^2) \right\}$
2. Misalkan  $R^4$  memiliki hasilkali dalam Euclidean. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$  menjadi sebuah basis ortonormal, jika
- $$\mathbf{u}_1 = (0, 2, 1, 0), \mathbf{u}_2 = (1, -1, 0, 0), \mathbf{u}_3 = (1, 2, 0, -1), \mathbf{u}_4 = (1, 0, 0, 1)$$

**" Terima Kasih, Semoga Bermanfaat "**